- **Einführung Teilchenphysik**

Prof. Thomas Hebbeker

- **Suche nach schweren Eichbosonen mit D0 (Tevatron)**

Dipl. Phys. Carsten Magass (Dokt.)

$$W' \rightarrow e \nu$$

- **Suche nach Higgs-Bosonen mit CMS (LHC)**

Tanja Rommerskirchen (Dipl.)

$$H \rightarrow \mu \mu$$

Die Struktur der Materie

elektromagnetische Kraft
(= elm. Wechselwirkung)

Kernkraft ~ starke Wechselwirkung

Das Standardmodell der Teilchenphysik

Materie: Spin $\frac{1}{2}$ - Fermionen:

Leptonen: $\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix}$?

Quarks: $\begin{pmatrix} u & u & u \\ d & d & d \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} c & c & c \\ s & s & s \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} t & t & t \\ b & b & b \end{pmatrix}$

Wechselwirkungen: Spin 1 – Eichbosonen:

elektroschwach:

Photon	γ	masselos
Z-Boson	Z	91 GeV
W-Boson	W^+ W^-	80 GeV

stark:

Gluon	g	masselos
-------	-----	----------

Neue Teilchen ?

- Higgs-Teilchen H

ohne dieses ist die Theorie unvollständig
(sagt sonst, dass alle Teilchenmassen null sind!)

- weitere Leptonen, Quarks, Eichbosonen ?

warum nicht ? erwartet bei Substruktur !

$$W \text{ (grid) } \rightarrow \text{ (yellow) } W'$$

- Supersymmetrische Teilchen ?

Methoden der experimentellen Teilchenphysik

Werkzeuge:

- Teilchenbeschleuniger
- Teilchendetektoren

Eliane Onursal

Unschärferelation: $\Delta x \approx 1 / E$

Studium der Kräfte bei hohen Energien:

(Big Bang!)

Neue schwere Teilchen (Masse m):

HOHE

ENERGIE !

Tevatron

DØ – Detektor

LHC = Large Hadron Collider – CMS-Experiment

7000 GeV p + 7000 GeV p

Start: 2007

CMS-Detektor im Aufbau

10/2005

Myon-Detektor

Datenanalyse

T
e
v
a
t
r
o
n

bisher

1.5 Milliarden

Ereignisse

auf Band

L
H
C

10^{11} Teilchen / s

100 Ereignisse / s à 1 Mbyte

10000 PCs

- Rekonstruktion von Myonen

- Suche nach Neuem ($H \rightarrow \mu\mu$, SUSY, $W' \rightarrow ev$)

Diplomarbeiten!

siehe GRID-Einführung Prof. Erdmann et al 26 C 201

Suche nach neuen Teilchen bei $D\bar{D}$: $W' \rightarrow e\nu$

Carsten Magaß

Prof. Dr. T. Hebbeker
(Chef)

Aachen @ $D\bar{D}$

Lotte Wilke
(ehem. Diplomandin)

III. Physikalisches Institut A
RWTH Aachen

DØ - Detektor : Ansicht

DØ - Detektor : Kontrollraum

Laufendes Experiment

Datennahme (Run II)
seit 2001

→ 1.5 Milliarden Ereignisse

→ 25 Millionen W Bosonen

→ 7.5 Millionen Z Bosonen

Was kann man bei DØ machen ?

Moderne Hochenergiephysik !!!

- Forschung & Entwicklung am Detektor : Hardware / Software
- Verifizierung bekannter Prozesse/Teilchen
 - Theorie richtig ?
 - Präzisionsmessung der Eigenschaften des top/bottom - Quarks und des W - Bosons
 - Abweichungen von der Theorie ?
- Suche nach neuen Phänomenen = Teilchen
Higgs, Supersymmetrie, W' , ...

W' - Boson = schwerer Partner des Standardmodell W - Bosons

Prinzip einer Analyse (I)

- Sprachgebrauch (Fachbegriffe, Jargon)
- Programmieren (C++ und Linux)

Beispiel : $W' \rightarrow e \nu$

Freier Parameter des neuen Teilchens (W') ist seine **Masse**

- Generiere Ereignisse mit Monte Carlo Generator
- Studiere Eigenschaften in Abhängigkeit von der Masse

Ereigniszahlen:

W ($m = 80 \text{ GeV}$) $\rightarrow e \nu$: 2.5 Millionen

W' ($m = 500 \text{ GeV}$) $\rightarrow e \nu$: 2500

W' ($m = 700 \text{ GeV}$) $\rightarrow e \nu$: 300

W' ($m = 900 \text{ GeV}$) $\rightarrow e \nu$: 50

W' ($m = 1 \text{ TeV}$) $\rightarrow e \nu$: 20

Beispiel : $W' \rightarrow e \nu$ (500 GeV)

Transverse Mass m_T

Ein Ereignis aus der Sicht des DØ - Detektors :

Standardmodell W

Mögliches Signal

Neutrino
-> fehlende Energie

Viele technische Herausforderungen . . .

Tevatron : $p \bar{p}$ bei 1.96 TeV → 1.7 Millionen Ereignisse / Sekunde
technisch machbar (viele Faktoren) → 50 Ereignisse / Sekunde

nicht sinnvoll : schreibe erste 50 Ereignisse weg, verwerfe Rest
sinnvoll : schaue jedes Ereignis grob (= schnell) an,
und schreibe ‚interessante‘ Ereignisse weg

→ 3-stufiges Auswahlssystem (Trigger)

Detektorverständnis :

- Rekonstruktion, Identifikation, Trigger, . . .
- Effizienzen
- Simulation des Detektors

We want you!

- Interesse an moderner Hochenergiephysik
- Interesse an Zusammenarbeit in einer Gruppe (Aachen) innerhalb einer großen internationalen Kollaboration
- Grundkenntnisse Programmieren, Englischkenntnisse

!!! Forschung an vorderster Front !!!

DØ - Schwerpunkt Neue Phänomene (Thomas Hebbeker) :
Christian Autermann, Jan Willem Coenen, Patrick Eraerds
Daniela Käfer, Carsten Magaß, Arnd Meyer, Volker Vorwerk

DØ - Schwerpunkte top Physik, Gridcomputing (Martin Erdmann) :
Steffen Kappler, Matthias Kirsch, Daniel Lenz

DØ - Detektor (I)

Multi - Purpose - Detektor
→ Prinzipiell kann alles gemessen werden (falls es produziert wird)

Suche nach neuer Physik am CMS Detektor

CERN

Nationality Distribution of CERN Users registered on 1/1/1999

Kollisionen am LHC

Der LHC und seine Experimente

General-purpose
Higgs
neue Physik ??

Schwere Ionen
Quark-Gluon Plasma

B-Physik
CP-Verletzung

General-purpose
Higgs
neue Physik ??

Bis zur Inbetriebnahme des LHC vergehen noch mind. 2 Jahre.

Wie macht man also eine Analyse ohne echte Daten?

Man simuliert Detektor und Prozess !

Datenanalyse bei CMS

Wozu sollte man sich schon jetzt mit einer CMS Analyse beschäftigen ?

- Um ein Gefühl für die Physik bei diesen Energien zu bekommen
- Um die Software 'im Griff zu haben' wenn der LHC startet
- Um Teil eines riesigen weltweiten Netzwerks von Menschen zu sein, die die Entwicklung des CMS Detektors vorantreiben
- Wenn ihr euch für eine Diplomarbeit bei CMS entscheidet, könnt ihr von Anfang an dabei sein wenn 'Terra Incognita' betreten wird

Ihr habt eine realistische Chance wirklich neue Physik zu finden !!!

Datenanalyse

Was werden ihr im Jahr eurer Diplomarbeit lernen?

- Ihr werdet selbständig in die Tiefen einer Theorie vordringen
Literaturrecherche betreiben und im direkten Kontakt mit
Theoretikern und anderen Elementarteilchenphysikern aus aller
Welt stehen
- Ihr werdet mit komplexen Programmpaketen arbeiten, die
laufend weiterentwickelt werden
- Ihr werdet ein Gefühl für den betrachteten Prozess und für die
Besonderheiten des Detektors entwickeln
- Ihr werdet lernen wie man Vorträge hält ; -)

Ein Beispiel ...

Doppelt geladene Higgs-Teilchen zerfallen in je 2 Myonen

Prozess: doppelt geladenes Higgs wurde vom D0-Experiment bis zu einer Masse von 100 GeV ausgeschlossen

Wir suchen zwischen 100 und 500 GeV

Vor der Selektion ...

Aus den 4 Myonen lässt sich die Higgs-Masse rekonstruieren
... wenn man die richtigen findet

CMS - Suche nach dem Unbekannten

Be a part of the future...